

FOKUS: Modul – Sexuell übertragbare Infektionen (STI)

UKKJ-FM

gültig ab: 01.05.2021

Version: 03

Seite 1 von 2

Modul: Diagnostik sexuell übertragbarer Infektionen (ST) bei Verdacht auf Kindesmisshandlung

Name des Kindes: _____

Geburtsdatum: _____

Geschlecht: männlich weiblich divers

Adresse: _____

Datum: _____

Patientenetikett

Die Durchführung von Laboruntersuchungen hinsichtlich STIs ist insbesondere indiziert bei

- Hinweisen auf eine **Penetration** (z.B. frische oder abgeheilte Penetrationsverletzungen genital, anal, oral) und/oder **Ejakulation**,
- bei Missbrauch durch einen **unbekannten Täter/fremde Person**,
- wenn der Täter eine **bekannte sexuell übertragbare Erkrankung** (STD) oder ein **hohes Risiko** dafür hat (i.v. Drogenabusus, MSM¹, multiple Sexualpartner),
- bei Vorliegen einer **STI eines anderen Kindes** (z.B. Geschwisterkind) in unmittelbarer Umgebung (z.B. gleicher Haushalt) und
- bei Hinweisen (Symptomen) auf eine sexuell übertragbare Krankheit (**anogenitaler Fluor, Schmerzen oder Juckreiz in der Anogenitalregion, urologische Symptomatik, genitale Läsionen/Ulcera**)

¹Men having sex with men

Anogenitaler Untersuchungsbefund:

Probennahme:

Material	Tests	Kontrollen
<input type="checkbox"/> Serum	Serologie: <input type="checkbox"/> HIV <input type="checkbox"/> HBV <input type="checkbox"/> HCV <input type="checkbox"/> Treponema pallidum PCR (EDTA-Blut)* <small>*Empfehlung: Kontrolle in 4 Wochen inkl. PCR für: Hep. B quant., Hep. C quant., HIV-RNA quant.</small>	4-6 Wochen 3 Monate 6 Monate
<input type="checkbox"/> Vulvo-Vaginalabstrich <input type="checkbox"/> Meatusabstrich	NAT: <input type="checkbox"/> C. trachomatis <input type="checkbox"/> N. gonorrhoeae <input type="checkbox"/> T. vaginalis Mikroskopie <input type="checkbox"/> T. vaginalis	2 Wochen
<input type="checkbox"/> Erststrahlurin <input type="checkbox"/> Pharyngealabstrich	NAT: <input type="checkbox"/> C. trachomatis <input type="checkbox"/> N. gonorrhoeae <input type="checkbox"/> T. vaginalis	2 Wochen
<input type="checkbox"/> Abstrich genitale Bläschen <input type="checkbox"/> Abstrich anale Bläschen	<input type="checkbox"/> NAT <input type="checkbox"/> Kultur (HSV)	2 Wochen

Infektionsdiagnostik und Interpretation bei V.a. sexuellen Missbrauch; (NAT =

Nukleinsäureamplifikationstest)

(nach: Meyer et al. Rechtsmedizin 2015, 25:107-109; Adams et al. Interpretation of Medical Findings in Suspected Child Sexual Abuse: An Update for 2018)

Erreger	Nachweisverfahren	Evidenz f. sex. Missbrauch
HIV*	Serologie	hochverdächtig
Treponema pallidum*	Serologie	hochverdächtig
Chlamydia trachomatis*	NAT, Kultur	hochverdächtig
Neisseria gonorrhoeae*	NAT, Kultur	hochverdächtig
Trichomonas vaginalis*	Kultur, Mikroskopie	hochverdächtig
Hepatitis B Virus	Serologie	verdächtig
Hepatitis C Virus	Serologie	verdächtig
Herpes simplex Viren	NAT, Kultivierung	möglich
Humane Papillomaviren	NAT	möglich
Molluscum contagiosum		möglich

*) Konnatale Infektion muss ausgeschlossen werden

→ Achtung: positive Ergebnisse müssen mit einem 2. Test bestätigt werden!

Datum, Uhrzeit

Name und Unterschrift der untersuchenden Fachkraft