

Anhang 3

**Therapie der akuten *Toxoplasma gondii* Infektion
während der Schwangerschaft**

1. Therapiebeginn

- Bis Schwangerschaftswoche 15+6:

Rovamycin® Filmtabletten (Spiramycin) á 375 mg

3x2 Tabletten täglich p.o.

- Ab Schwangerschaftswoche 16+0:

„Kombinationstherapie“ (für 4 Wochen):

Daraprim® Tabletten (Pyrimethamin) á 25 mg

1. Tag 2x1 Tablette, danach 1 Tablette täglich p.o.

Sulfadiazin Tabletten á 500mg

1. Tag 3x1 Tablette, danach 1x1,5 Tabletten täglich p.o.

Calciumfolinat® (Folinsäure) á 15 mg

Montag, Mittwoch, Freitag 1 Tablette p.o.

**2. Weitere durchgehende Therapie in Abhängigkeit von Fruchtwasser-PCR
(Polymerase-Ketten-Reaktion)-Befund bis zur Geburt**

- Positive PCR aus Fruchtwasser oder Amniozentese nicht erfolgt:

Alternierend 4 Wochen Kombinationstherapie (Pyrimethamin, Sulfadiazin und Folinsäure) und 4 Wochen Spiramycin

- Negative PCR aus Fruchtwasser: Spiramycin